

Wartości graniczne i skutki ekspozycji „złego” ozonu



Stężenie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Skutki oddziaływania ozonu i wartości graniczne
40	wyczuwalny zapach
100	ból głowy, podrażnienie oczu*
110	podrażnienie dróg oddechowych, obniżenie wydolności*
160	zapalenie dróg oddechowych*
180	wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych
200	problemy z oddychaniem
240	alarmowe poziomy stężenie ozonu dla okresu uśredniania jednej godziny
260	możliwość wystąpienia ataków astmy
> 400	obniżona wydolność, trwałe zniszczenia komórek
> 1000	uszkodzenia chromosomów

* u osób wrażliwych (grupa ryzyka: dzieci, osoby starsze, astmatycy, sportowcy itp.)



PRZECIWDZIAŁANIA

Działania organizacyjne:

- Ograniczyć emisję prekursorów ze środków transportu. W sytuacjach ekstremalnych ograniczenie ruchu samochodowego.



Działania indywidualne:

- Osoby z przewlekłymi chorobami (układu oddechowego i niewydolnością układu krążenia) powinny pozostawać w pomieszczeniach.
- Unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.
- Ograniczenie dużego wysiłku fizycznego (uprawianie sportów wymagających dużego wysiłku i gier sportowych na otwartej przestrzeni, jazdy na rowerze).
- Unikanie lub przynajmniej ograniczenie palenia tytoniu oraz biernego palenia.




Więcej informacji

www.wios.warszawa.pl
www.powietrze.gios.gov.pl



„w pigułce”

Część I



Ozon „zły” /w troposferze/

- Niekorzystnie wpływa na zdrowie
 - Szkodzi roślinom
- Jako gaz cieplarniany przyczynia się do globalnego ocieplenia



Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
w Warszawie

2014 r.

- W przygruntowej warstwie powietrza ozon jest potrzebny, ale w małych ilościach. Przyczynia się do oczyszczania powietrza.
- W przypadku nadmiernego stężenia ozonu działa szkodliwie i jest niepożądany.
- W ostatnich latach notuje się wzrost stężeń ozonu. Spowodowane jest to wzrostem stężeń NO₂ w powietrzu głównie ze względu na dynamicznie rozwijającą się komunikację samochodową.
- Stężenie ozonu zależy od stopnia zanieczyszczenia powietrza i promieniowania słonecznego. W warunkach dużego zanieczyszczenia (związkami azotu i lotnymi związkami organicznymi) oraz dużego nasłonecznienia zachodzą skomplikowane reakcje fotochemiczne, których efektem mogą być wysokie stężenia ozonu głównie na obszarach pozamiejskich lub tzw. smog fotochemiczny (mieszanka m.in. tlenków azotu, ozonu i węglowodorów). Są one szkodliwe dla ludzi, zwierząt, roślin oraz klimatu globalnego.
- Warunki powstawania **wysokich stężeń ozonu:**
 - wysokie emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu i lotnych związków organicznych z transportu samochodowego, przemysłu paliwowego, drukarskiego, lakierniczego itp.,
 - warunki pogodowe: wysoka temperatura: 24-35°C odpowiednie nasłonecznienie i wilgotność powietrza
- Wzrost stężeń obserwuje się z reguły na dużych obszarach, głównie pozamiejskich. Maksymalne stężenia występują zazwyczaj w godzinach popołudniowych.
- Zbyt wysokie stężenie ozonu przyziemnego w sezonie letnim, obok problemów z: pyłem zawieszonym, benzo(a)pirenem i dwutlenkiem azotu, należy do najważniejszych problemów zanieczyszczenia powietrza zarówno w Polsce, Europie jak i na świecie.

Stacje monitoringu powietrza realizujące pomiar ozonu w województwie mazowieckim



Nazwa stacji


1. Płock-Królowej Jadwigi
2. Granica-KPN
3. Legionowo-Zegrzyńska
4. Piastów-Pułaskiego
5. Warszawa-Podlesna
6. Warszawa-Kondratowicza
7. Warszawa-Wokalna
8. Belsk-IGPAN
9. Siedlce-Konarskiego
10. Radom-Tochtermana

- Legenda:
- Stacja mierząca O₃
 - strefa

Na stronie internetowej

<http://sojp.wios.warszawa.pl>

uzyskasz informacje o bieżących stężeniach ozonu w postaci tabel oraz wykresów.



Przykładowy przebieg stężeń na stacji Warszawa-Ursynów (ul. Wokalna)



Wartość progowa informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych



dla okresu uśredniania jedna godzina – 180 µg/m³



Alarmowy poziom ozonu

dla okresu uśredniania jedna godzina – 240 µg/m³

Dopuszczalne poziomy ozonu w powietrzu i dopuszczalne częstotści przekraczania tych poziomów

- dla zdrowia ludzi

- Poziom dopuszczalny: maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczonych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby – wynosi 120 µg/m³.
- Do 31.12.2019 – dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym – 25 razy.
- Od 1.01.2020 – dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym – 0 razy.

- dla ochrony roślin

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (wyrażony jako AOT 40):

do 31.12.2019 – 18000 µg/m³*h,

od 1.01.2020 – 6000 µg/m³*h.